



Banatro[®] plus

- Bevat het galacto-oligosachariden mengsel Bimuno[®] (B-GOS)
- Bevat gedroogde bananen schilfers als bron voor oplosbare pectine vezels.

Dieetvoeding bij: diarree of te dunne ontlasting bij: Sondevoeding, "Short bowel," Ileostoma, Antibiotica gebruik, Chemo- en/of radiotherapie. Banatro[®] Plus is een "Voeding voor medisch gebruik" Dit product alleen op advies van een arts of diëtist en onder medisch toezicht gebruiken.



Netto gewicht 10,75 g

Item 18480
GLNP-19-01

Bevat Bimuno[®]

Bimuno[®] is een geregistreerd handelsmerk van Clasado IP Limited en wordt beschermd door meerdere patenten

Voor klinische studies welke het gebruik van dit product ondersteunen, zie: www.glnp.nl
Loun: Houdbaar tot: R10D

Gedistribueerd in België: Door GLNP BV
Nikkestraat 21
1411AE Naarden
0031(0)20-2620252
info@glnp.nl
www.glnp.nl - www.glnp.be

Geproduceerd in USA door
Meditation, Inc.
Lancaster, PA 17606-5387



Voedingswaarden	
Energie	1 sachet 40kcal - 168kJ gewicht 10,75g
Totaal vet	0 g
Koolhydraten	10 g
Suikers	7 g
Eiwit	0 g
Dieetvezels	2 g
Natrium	15 mg
Kalium	125 mg
Fosfor	9 mg
Calcium	3 mg

Bij toediening via een maag-, jejunum of peg-sonde. Gebruik minimaal een 14-Ch sonde en het originele Banatro[®] Plus product. **Dosering:** meestal 3-4 x/dag 1 sachet. Los het al roerend op in 120ml water. Spuit voortaf sonde door met 30ml water. Zing het opgeloste Banatro[®] Plus op in de spuit en dien het direct na het opzigen toe via de sonde. Spoel de sonde na toediening van de Banatro[®] Plus door met 30ml water. **Advies: voeg Banatro[®] Plus niet toe aan sondevoeding.**

Ingrediënten: Bananen flakes, Bimuno[®] (trans-galacto-oligosacharide mengsel, B-GOS), Lactose, Glucose, Galactose.

Verorzaakt geen obstipatie.

Bewaarcondities: 15-25°C. Na openen direct gebruiken.

Bevat 0 microg vit K/sachet
Bevat 0,27g lactose per sachet
Glutenvrij

Contraindicatie: Latex-voedsel syndroom

WAARSCHUWING: NIET BESTEMD VOOR PARENTERAAL GEBRUIK

Dit product onder medisch toezicht gebruiken
De dosering wordt bepaald door arts of diëtist
Dit product is niet geschikt om als enige voedingsbron te dienen
Leefstijlscategorie: ≥ 4 jaar

Bij oraal gebruik in geval van diarree: Veelal 3 x/dag 1 sachet Banatro[®] Plus. Voeg de inhoud toe aan 120ml water voor een goed smakende drank, of voeg het toe aan: vruchtensap (niet bij high output ileostoma), oppelmoes, yoghurt of pudding. Ga er mee door tot dat de diarree over is. Maximaal 5-7 dagen nodig om volledig effect te bereiken. Dosering aanpassen aan het beoogde effect. Minimaal 1 en maximaal 6 sachets per dag en niet meer dan 2 sachets tegelijk. In geval van dunne ontsteking: 1-2 x/dag 1 sachets naar behoefte. Voor patiënten met een stoma of bij sondevoeding kan Banatro[®] Plus zonnig langdurig worden gebruikt.